



Informatiefolder ANLb 2023 – 2028

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Opsteller: M. van Beek

Tarieven

De pakketten en tarieven zijn definitief vastgesteld op 19 januari 2023. De herziening en vaststelling heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2024. -> toevoeging pakket wiedege en winterbegrazing



Uitkomende grutto (foto: Maarten van Beek)

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Weidevogelbeheer - Inleiding	3
Weidevogelbeheer – Water – Pakket 3: greppelpas-dras	4
Weidevogelbeheer – Water – Pakket 8: hoogwaterpeil	5
Weidevogelbeheer – Pakketten 1a t/m d: grasland met rust door later maaien	6
Weidevogelbeheer – Wiedeggen Z26.01.99 - NIEUW	7
Weidevogelbeheer – Pakketten 1l t/m u: grasland met rust na voorweiden	9
Weidevogelbeheer – Beweiden – Pakket 6: extensief beweide grasland	10
Weidevogelbeheer – Pakket 7: ruige mest	11
<i>Ruige mest draagt bij aan een goed bodemleven</i>	11
Weidevogelbeheer – Pakket 5: kruidenrijk grasland	12
Weidevogelbeheer – Pakket 41: ontwikkeling kruidenrijk grasland	13
Weidevogelbeheer Winterbeweiding – Z 26.05.99 NIEUW	14
Weidevogelbeheer – Pakket 45: kievitstrook	15
Opmerkingen	15
Weidevogelbeheer – Mozaïekvergoeding	16
Weidevogelbeheer – Pakket 4a: legselbeheer op grasland en pakket 42: legselbeheer op bouwland	17
Beheereisen pakket 42	17
Weidevogelbeheer – Pakketten 4b t/m f: kuikenvelden	18
Weidevogelbeheer – Pakket 51: predatierasters	19
Weidevogelbeheer – Pakket 30a: zwarte Stern	20
Water - Inleiding	22
Water – Pakket 13c: botanische grasland randen	23
Water – Pakket 10ad: natuurvriendelijke oever	24
Water – Pakket 12a: baggeren met baggerspuit	25
Water – Pakket 12b: ecologisch slootschonen	26
Water – Pakket 12c: ecologisch slootschonen (krabbenscheersloten)	27
Water – Slotenplan	29
Dooradering – Pakket 9: poel	30
Dooradering – Pakket 20: hakhoutsingel	31
Dooradering – Pakket 21: beheer van (knot)bomenrijen	32
Dooradering – Pakket 26: hoogstamboomgaard	33
Dooradering – Pakket 27: hakhoutbosje	34
Verenigingspakket Z11: oeverwaluwand	35

Voorwoord

De aanloop naar de nieuwe periode agrarisch natuurbeheer heeft veel overeenkomsten met de opgaven waar de agrarische sector momenteel mee te maken heeft. Onduidelijkheid is het woord wat het meest valt, samen met 'hoe dan'?

De opgaven die overheid en samenleving aan de landbouw stellen, wil men allemaal tegelijkertijd opleggen aan de agrariërs, maar worden aan de andere kant niet integraal benaderd. Een voorbeeld hiervan is de hectaretoeslag. Hiervoor is een systeem ontwikkeld dat een beloning biedt aan agrariërs die bijdragen aan natuur en landschap, de zogenaamde eco-regelingen, een versterking voor het agrarisch natuurbeheer waarbij elke agrariër in zou kunnen stappen. Aan de ontwikkeling van deze eco-regelingen is jaren gewerkt, maar het huidige resultaat is dat er nog geen rekentool beschikbaar is om beide middelen naast elkaar te berekenen. En hoewel theoretisch alles op 1 januari ingevuld zou moeten zijn, hebben de meeste ondernemers hun bouwplan in oktober al klaar.

“Het eerste weidevogelnest wat je vindt in het voorjaar”

Ondertussen gaan we door met de invulling van het agrarisch natuurbeheer. Laten we even uitzoomen op alles wat speelt en kijken we naar het voorjaar: de weidevogels vliegen straks weer door de polders, de kievit zoekt het mooiste maïspolletje uit voor een nest en de tureluur zoekt de beste plas-dras. En dat met het doel om jongen groot te brengen.

Het voorjaar is ook een moment dat de koeien voor het eerst naar buiten mogen. Hoe zorg je ervoor dat dit goed verloopt? Vanuit de ervaringen van afgelopen jaren: kan er voor de weidevogels nog een tandje bij? Is het mogelijk het bouwplan nog wat aan te passen om de kuikens een extra handje te helpen? Zodat je je straks tijdens het maaien kan verwonderen over de weelde aan weidevogels bij de greppelplas-dras.

Naast weidevogels kan je je inzetten voor andere doelen als waterbeheer of beplanting. Met de vele kilometers aan sloten zouden we veel kunnen doen met biodiversiteit. Denk aan krabbenscheer-sloten, bloeiende kattenstaarten in de oevers en bloesemende boomgaarden. Zo kunnen we steenuilen, libellen en wilde bijen (niet de honingbij) helpen. Voldoende mogelijkheden!

Natuurbeheer gaat over verwondering. Elk jaar is hierin anders. Hoe het precies gaat zien we pas in het volgende jaar. Voor nu kunnen we hier een goed plan voor maken.



Weidevogelbeheer - Inleiding

Kuikens grootbrengen met voorweiden

Introductie

Rust, water en mozaïek zijn van belang wanneer we de weidevogels beschermen. Elke fase van het weidevogelseizoen heeft zijn eigen eisen voor wat betreft beheer. Vanaf half februari komen de eerste grutto's uit het zuiden terug in Nederland. Na een lange reis is het voor de vogels belangrijk om voldoende voedsel te vinden om zich klaar te maken voor een zwaar broedseizoen. Plas-drassen zijn hierbij essentieel. Soms voor het foerageren en ook als veilige plek waar ze kunnen rusten.

De fase erna gaat om de legsels. Het succes om de legsels uit te broeden is het grootst met rust en met een grote groep weidevogels, om zo de predatoren weg te houden. De plas-drassen zorgen voor een sterkere concentratie in aantallen weidevogels. Het niet bewerken van het land zorgt voor de rust. Desondanks broeden ze ook op percelen waar bewerkt moet worden. Voor bouwland kan dit met er omheen werken of de nesten te verplaatsen in mandjes. Voor weiland kan dit door broedeilanden te laten staan van minimaal 50m² met een straal van 3,5m. Liever nog groter: 150m². Mochten er meer nesten bij elkaar liggen, maak er één broedeiland van. Bij beweiding wordt er een draadje omheen gezet.

De volgende fase gaat om de kuikens. Deze kwetsbare wezens hebben warmte, voedsel en dekking nodig. Deze fase is kritisch. Het moet namelijk ook allemaal bereikbaar zijn, doorwaadbaar. Dit wordt gerealiseerd met plas-dras (d.m.v. slikranden), kruidenrijk grasland (voedsel) en extensief- of voorweiden. Wanneer de kuikens groot zijn verzamelen ze bij de plas-drassen.

Legsels concentreren zich rondom de greppelplas-dras

Mozaïekbeheer en goed kuikenland is van groot belang. Door ruige mest of geen mest toe te passen op rustpercelen groeit het gras trager. Daardoor is dit beter doorwaadbaar voor de kuikens. Dit zorgt ook voor een betere kwaliteit gras bij het oogsten. Water is essentieel en kan in de vorm van volveldsplas-dras, greppelplas-dras en hoog waterpeil. Het liefst in combinatie met kruidenrijk grasland. Kortweg is dit grasland wat alleen bemest wordt met ruige mest. Echter kan dit ook door middel van voorweiden of extensief weiden. Dit zorgt voor rust en open structuur. We realiseren ons dat dit een zorgvuldige planning behoeft, dat het bouwplan wellicht aangepast moet worden en dat het weer een belangrijke rol kan spelen. Daarvoor krijgt u op een combinatie van zwaar beheer (rust) en (greppel)plas-dras een extra toeslag.

Ondanks de aantrekkingskracht van een greppelplas-dras gaan niet alle vogels hieromheen zitten. Hiervoor hebben we flexibel beheer: beheer wat in het seizoen afgesloten kan worden.

Concreet vragen we om >20% zwaar beheer. Daarbij een greppelplas-dras van minimaal 0,3ha en kruidenrijk grasland >1ha.

Weidevogelbeheer – Water – Pakket 3: greppelplas-dras

Water op het land werkt als een magneet voor weidevogels. Ze vinden hier veiligheid om in te slapen en ze vinden voedsel.

Volvelds plas-drassen trekken vogels in het voorjaar aan zodat ze van hieruit een broedplaats kunnen realiseren. De greppel plas-drassen zijn onweerstaanbaar voor vogels. Dit zorgt ervoor dat de vogels concentreren en daarbij minder op de percelen zitten waar geen zwaar beheer is. In droge tijden zijn (greppel) plas-drassen en hoog waterpeil 'levensaders' voor de weidevogels. Idealiter is een plas-dras omgeven door kruidenrijk grasland (zie pakket 5 op pag. 10).

Een plas-dras kost de deelnemer extra tijd en inspanning. Dit wordt vergoed met een mozaïektoeslag (zie pag. 13). De 'extra' toeslag geldt voor alle percelen met zwaar beheer.

Beheereisen

- De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig)
- Greppelplas-dras: Het perceel heeft een of meerdere greppels die vol water staan en die zorgen voor een drassige zone aan weerszijden van de greppel(s)

Het collectief stelt een pomp beschikbaar in de totale beheerperiode

Vergoedingen per pakket per hectare

3n Plas-dras 1 maart tot 1 juni

3o Plas-dras 1 maart tot 15 juni

3p Plas-dras 1 maart tot 1 juli

Last minute bij droogte:

3i Plas-dras in de periode van 1 mei tot 1 augustus, ten minste 3 weken € 800,-

3j Plas-dras in de periode van 1 mei tot 1 augustus, ten minste 4 weken € 1100,-

Opmerkingen

- Verlengingen in het seizoen zijn mogelijk in overleg met de gebiedscoördinator
- Bij de greppelplas-dras van 15 juni en 1 juli is het wenselijk om eind mei het peil lager te zetten. De drooggevallen delen zijn slikranden voor de kuikens. In overleg mogelijk met de gebiedscoördinator
- Het is mogelijk een vossenraster om de plas-dras te plaatsen (in sloten). Beperkt aantal beschikbaar via het collectief

Weidevogelbeheer – Water – Pakket 8: hoogwaterpeil

Een plas-dras is niet altijd mogelijk vanwege de bolling van een perceel of het ontbreken van greppels. Als alternatief (of aanvulling) kan gedacht worden aan hoog waterpeil. Dit is het opzetten van het slootpeil tot vlak onder het maaiveld. De vergoeding geldt tot 25m vanaf de sloot aan beide kanten.

Telt mee voor mozaïektoeslag, zie pagina 13.

Beheereisen

- Door een tijdelijke, plaatselijke voorziening (bijv. stuw) of afsluiten van een duiker is het oppervlaktewaterpeil van minimaal 15 februari tot 15 juni minimaal 20 (of 30 c.q. 40) cm hoger dan het omringende slootpeil.

Vergoedingen per hectare per jaar

8b verhoging 30 cm, 15 februari tot 15 juni

8c verhoging 40 cm, 15 februari tot 15 juni

Opmerkingen

- Er wordt door het collectief een vergunning aangevraagd bij het waterschap om het peil hoger te zetten in sloten
- Pompen worden indien nodig door het collectief beschikbaar gesteld



Hoog waterpeil kan werken als een magneet voor vogels. Het voedsel is makkelijker te verkrijgen (foto: Maarten van Beek)

Weidevogelbeheer – Pakketten 1a t/m d: grasland met rust door later maaien

Rust is voor weidevogels heel belangrijk. Van het zoeken naar een nest tot de laatste jongen die uitvliegen. Een belangrijk punt is de kwaliteit van het rustgebied. Ze moeten zo lang mogelijk goed doorwaadbaar zijn voor de kuikens. Ideaal is geen drijfmest en in het midden een greppelpas-dras.

Telt mee voor mozaïektoeslag, zie pag. 13. Goede combi met greppelpas-dras, zie pagina 4.

Beheereisen

- Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf 1 april
- In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats
- De rustperiode duurt tot minimaal 1 juni en eindigt als het gras niet meer nodig is voor de overleving van de kuikens van de weidevogels, voornamelijk de grutto. De vergoeding wordt bepaald tot de datum dat het perceel voor maaien is 'vrijgegeven'
- Liever geen kunst- en/of drijfmest vooraf, geeft een te zwaar gewas
- Op deze pakketten is een ruige mest-toeslag (pakket 7, pag. 9) mogelijk. Ruige mest trekt vogels aan en zorgt voor een geleidelijke grasgroei. Ook hier is het belangrijk te bedenken of de mest niet te snel tot een zwaar gewas zal leiden.

Zorg voor rust en doorloopbaar gras voor de kuikens

Vergoedingen per hectare per jaar

1a rust van 1 april tot 1 juni

1b rust van 1 april tot 8 juni

1c rust van 1 april tot 15 juni

1d rust van 1 april tot 22 juni

Opmerkingen

- Het te voet betreden van het perceel tijdens de rustperiode moet zoveel mogelijk worden beperkt. Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de gebiedscoördinator
- Geen honden en katten toegestaan in het perceel
- Vervroegen van de maaidatum dient in overleg met de gebiedscoördinator te gebeuren en dient minimaal een week voor het einde van de rustdatum aangevraagd te worden. Er wordt dan gekeken naar de aanwezigheid van nesten en/of kuikens. Bij het vervroegen wordt de vergoeding aangepast naar de uiteindelijk gerealiseerde rustperiode
- 'Vrijgeven' van het perceel gebeurt in overleg met de gebiedscoördinator / polderregisseur

Weidevogelbeheer – Wiedeggen Z26.01.99 - NIEUW

Optimaliseren van kuikenland op kruidenrijke graslanden (pakket 01x rustperiode, zonder voorweiden). Door verandering in klimatologische omstandigheden groeit het gewas sneller in het voorjaar en mogelijk al in de winter. Dit leidt tot problemen in doorwaadbaarheid voor jonge kuikens in mei. Ook gaat het kwaliteit van het gewas harder achteruit naar een bepaalde stadia (verhouting). Dit maakt het minder aantrekkelijk voor bijvoorbeeld pinken om het tot zich te nemen. Om het kwaliteit van kuikenland en gewas te bevorderen is het gewenst de grasgroei te vertragen in het voorjaar. Met blijvend grasland is de enige mogelijkheid dit effectief toe te passen met een wiedeg *Dit nieuwe pakket is om te experimenteren met mogelijkheden voor optimalisatie. Het limiet is 10 deelnemers met elk 1 perceel in 2025.*

Pakketvoorwaarden

- Bewerking grasland met de wiedeg voor 1 april;
- Max. 5 cm gras hoogte op 1 maart door winterbeweiding;
- Melding binnen 5 werkdagen voor uitvoering werkzaamheden;
- Samen afgesloten met pakket rustperiode 01 (tot 1, 8 of 15 juni).

Vergoeding (na melden)



Adviezen

- Bemesting met ruige mest is het meest effectief voor het stimuleren van het bodemleven.
- Dit pakket kan worden gecombineerd met Ruige mest en met Hoog waterpeil.
- Alleen bij daglicht maaien. Als u in het donker maait, hebben de kuikens onvoldoende gelegenheid een veilige plek te zoeken.
- Van binnen naar buiten maaien. Als u op het midden van uw perceel met maaien start en vervolgens naar de buitenkant maait, hebben kuikens de gelegenheid naar naastgelegen percelen te vluchten en raken ze niet opgesloten in een steeds kleiner wordend stuk grasland.

Weidevogelbeheer – Pakketten 1l t/m u: grasland met rust na voorweiden

Telt mee voor mozaïektoeslag, zie pagina 13.

Beheereisen

- Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf 1, 8 of 15 mei. Tot die datum wordt het perceel beweide met koeien of schapen
- In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats
- Het grasland wordt vanaf 1 maart en voorafgaande aan de rustperiode niet gemaaid
- De rustperiode duurt tot minimaal 4 weken en eindigt als het gras niet meer nodig is voor de overleving van de kuikens van de weidevogels, voornamelijk de grutto. De vergoeding wordt bepaald tot de datum dat het perceel voor maaien is 'vrijgegeven'
- Liever geen kunst- en/of drijfmest vooraf, geeft een te zwaar gewas
- Op deze pakketten is een ruige mest-toeslag (pakket 7, pag. 9) mogelijk. Ruige mest trekt vogels aan en zorgt voor een geleidelijke grasgroei. Ook hier is het belangrijk te bedenken of de mest niet te snel tot een zwaar gewas zal leiden

Vergoedingen per hectare per jaar

- 1l voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 15 juni
- 1m voorweiden tot 8 mei, daarna rust tot 22 juni
- 1q voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 1 juni
- 1r voorweiden tot 8 mei, daarna rust tot 8 juni
- 1s voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 8 juni
- 1u voorweiden tot 15 mei, daarna rust tot 15 juni

Opmerkingen

- Het te voet betreden van het perceel tijdens de rustperiode moet zoveel mogelijk worden beperkt. Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de gebiedscoördinator
- Geen honden en katten toegestaan in het perceel
- Vervroegen van de maaidatum dient in overleg met de gebiedscoördinator te gebeuren en dient minimaal een week voor het einde van de rustdatum aangevraagd te worden. Er zal dan gekeken worden naar de aanwezigheid van nesten en/of kuikens. Bij het vervroegen wordt de vergoeding aangepast naar de uiteindelijk gerealiseerde rustperiode
- 'Vrijgeven' van het perceel gebeurt in overleg met de gebiedscoördinator/ polderregisseur

Weidevogelbeheer – Beweiden – Pakket 6: extensief beweid grasland

Dit grasland is bedoeld voor weidevogelkuikens die behoefte hebben aan korter gras, denk aan de kievit. Het gaat er bij dit pakket om dat het vee de grasgroei net niet kan bijhouden. Zodoende ontstaat er een structuurrijke vegetatie met hoge en lage delen, die voedsel biedt en goed doorwaadbaar is voor weidevogelkuikens.

Telt mee voor mozaïektoeslag, zie pagina 13.

Beheereisen

- Tijdens de rustperiode wordt de beheereenheid niet bewerkt. Beweiden mag wel
- Beweiding is verplicht van 1 mei tot 15 juni met minimaal 1 en maximaal 1,5 of 3 GVE veebezetting (afhankelijk van grasgroei)
- De beheereenheid mag tussen 1 april en 1 mei niet gemaaid worden
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is tijdens de rustperiode niet toegestaan. Buiten die periode alleen voor pleksgewijze bestrijding van probleemonkruiden op maximaal 10% van de beheereenheid.

Vergoedingen per hectare per jaar

6a beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, 1 GVE/ha tot 1,5 GVE/ha

6c beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, 1 GVE/ha tot 3 GVE/ha

6d Beweiding verplicht van 1 mei tot 1 juli, 1 GVE/ha tot 1,5 GVE/ha

Vee	GVE
Rundvee > 2 jaar	1
Rundvee < 6 maanden	0,4
Rundvee 6 mnd - 2 jaar	0,6
Paard > 6mnd	1
Schaap / geit	0,15
Lammeren	0,15
Fokzeugen > 50 kg	0,5
Andere varkens	0,3

Opmerkingen

- Mag alleen in samenhang met een ander zwaar beheer pakket

Weidevogelbeheer – Pakket 7: ruige mest

De hoeveelheid mest en het type mest bepaalt de kruidenrijkdom van het kuikenland. Voor een doorwaadbaar gewas met wormen is een lichtere bemesting nodig. Ruige mest is goed voor het beschikbare bodemleven voor de oudervogels. Dit resulteert in de bedrijfsvoering met een minder snelgroeiend gewas op de percelen met uitgestelde bewerkingen en daardoor een betere kwaliteit gewas tijdens de oogst. Het liefst geen mest voor de eerste snede en de ruige mest later in het seizoen opbrengen.

Ruige mest draagt bij aan een goed bodemleven

Beheereisen

- Toeslag uitsluitend in combinatie met pakketten met een rustperiode (ook voorweiden), kruidenrijk grasland of extensief beweiden
- Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar bij voorkeur ten minste 5 en maximaal 10 ton ruige stalmest per hectare uitgereden.
- De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september opgebracht.

Melden

Melding binnen 3 werkdagen via mijnboerennatuur.nl

Vergoedingen per hectare per jaar

7a ruige mest

Weidevogelbeheer – Pakket 5: kruidenrijk grasland

Kruidenrijke graslanden zijn percelen waar kuikens heel goed kunnen opgroeien. De vegetatie is er ijler, dus beter doorwaadbaar voor kuikens, en de bloeiende kruiden trekken (grotere) insecten aan die de kuikens kunnen eten. Ook zijn de kruiden belangrijk voor vlinders, libellen en hommels.

Verhoogt het bedrag van de mozaïektoeslag in combinatie met greppelplas-dras.

Beheereisen

- Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 15 juni, of zoveel langer als nodig voor de aanwezige weidevogelkuikens
- In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats
- Het gewas wordt jaarlijks minimaal één keer gemaaid en afgevoerd, vóór 1 augustus
- Minimaal vier verschillende indicatorsoorten zijn in een meetvak aanwezig
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel
- Uitsluitend bemesting met ruige mest (vaste mest), 5 – 10 ton per ha, toegestaan buiten de rustperiode.
- Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
- Er mag geen bagger of maaisel (slootkant) opgebracht worden.

Kruiden trekken grotere insecten aan, voedsel voor oudere kuikens

Vergoedingen per hectare per jaar

5a Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 15 juni

5b Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 22 juni

5c Kruidenrijk grasland, rust 1 april tot 1 juli

Opmerkingen

- Het kan dan zijn dat ingezaaid kruidenrijk grasland eerst als pakket 41 (ontwikkeling kruidenrijk grasland, zie pag. 11) wordt ingeschaald door het collectief
- Het te voet betreden van het perceel tijdens de rustperiode moet zoveel mogelijk worden beperkt. Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de gebiedscoördinator
- Geen honden en katten toegestaan in het perceel
- 'Vrijgeven' van het perceel gebeurt in overleg met de gebiedscoördinator / polderregisseur

Weidevogelbeheer – Pakket 41: ontwikkeling kruidenrijk grasland

Kruidenrijke percelen die niet schraal genoeg zijn of grote delen met witbol en/ of glanshaver hebben, zijn (nog) niet geschikt genoeg voor weidevogelkuikens. Om goed te verschrallen en witbol/ glanshaver terug te dringen, is vaker maaien en afvoeren en het beperken van de bemesting een goede aanpak. Dit pakket is een tussenfase tussen regulier grasland en kruidenrijk grasland.

Telt mee voor mozaïektoeslag, zie pagina 13.

Beheereisen

- Pakket b (doorbreken witboldominantie): rustperiode van 1 april tot 22 mei
- Pakket d (kuikenveld bij doorbreken witboldominantie): rustperiode van 1 april tot 15 juni
- De beheereenheid wordt niet of minimaal bemest (max. 5-10 ton ruige mest per ha) en er wordt geen bagger opgebracht. Bemesting altijd in overleg met de gebiedscoördinator
- Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv. op stalkaart of digitaal (via de database van www.boerenlandvogelsnederland.nl))
- Gevonden nesten worden beschermd als er werkzaamheden op afzienbare tijd plaatsvinden
- Wanneer er wordt gemaaid, wordt een enclave van ten minste 50 m² met minimaal een straal van 3,5 meter aangehouden om de aanwezige gevonden nesten
- Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op minimaal 90% van de oppervlakte
- Er mag geen bagger of maaisel (slootkant) opgebracht worden

Vergoeding per hectare per jaar

41a Ontwikkeling (niet productief) kruidenrijk grasland

41b Rustperiode van 1 april - 22 mei; doorbreken witboldominantie

41d Doorbreken witboldominantie plus aansluitend kuikenveld, verlenging rustperiode tot 15 juni

Opmerkingen

- Intensief maaien en afvoeren versnelt de verschraling
- Jaarlijks controleren of het perceel voldoet aan kruidenrijk grasland (pakket 5, pag. 10)
- Het te voet betreden van het perceel tijdens de rustperiode moet zoveel mogelijk worden beperkt. Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de gebiedscoördinator
- Geen honden en katten toegestaan in het perceel
- 'Vrijgeven' van het perceel gebeurt in overleg met de gebiedscoördinator / polderregisseur

Weidevogelbeheer Winterbeweiding – Z 26.05.99 **NIEUW**

Doel

Optimaliseren van kuikenland op kruidenrijke graslanden (pakket 05x of 41x). Door verandering in klimatologische omstandigheden groeit het gewas sneller in het voorjaar en mogelijk al in de winter. Dit leidt tot problemen in doorwaadbaarheid voor jonge kuikens eind mei en in juni. Ook gaat het kwaliteit van het gewas harder achteruit naar een bepaalde stadia (verhouting). Dit maakt het minder aantrekkelijk voor bijvoorbeeld pinken om het tot zich te nemen. Om het kwaliteit van kuikenland en gewas te bevorderen is het gewenst zo kort mogelijk de winter uit te laten komen. *Dit nieuwe pakket is om te experimenteren met mogelijkheden voor optimalisatie.*

Pakketvoorwaarden

- Winterbegrazing met vee als schapen of andere dieren
- Gewenst 5 cm (en max. 7cm) gras hoogte op 1 april
- Melding eind maart voor uitvoering werkzaamheden
- Samen afgesloten met pakket 05x of 41x

Vergoeding (na melden)

- per hectare

Adviezen

- Bemest (ruige mest) eerste 2 jaar naar omvorming niet. Door maaien en afvoeren kom je eerder in gewenste stadia van kruiden voor koe en weidevogel.
- Bemesting met ruige mest is het meest effectief voor het stimuleren van het bodemleven.
- Dit pakket kan worden gecombineerd met Ruige mest en met Hoog waterpeil.
- Alleen bij daglicht maaien. Als u in het donker maait, hebben de kuikens onvoldoende gelegenheid een veilige plek te zoeken.
- Van binnen naar buiten maaien. Als u op het midden van uw perceel met maaien start en vervolgens naar de buitenkant maait, hebben kuikens de gelegenheid naar naastgelegen percelen te vluchten en raken ze niet opgesloten in een steeds kleiner wordend stuk grasland.

Weidevogelbeheer – Pakket 45: kievitstrook

Kieviten zijn liefhebbers van akkers en korte vegetatie. Daarnaast helpen ze andere weidevogels als tureluur met alarmeren op gevaar. Een kievitstrook is een braakliggende strook die niet bewerkt wordt. De kale grond in het begin van het broedseizoen trekt broedparen aan. De kruiden die er vervolgens later in het seizoen op groeien bieden dekking en voedsel voor de kuikens. Vooral interessant in gebieden waar geen akkers zijn. Of waar je nesten wilt verplaatsen bij bewerkingen naar deze strook.

Telt mee voor mozaïektoeslag, zie pagina 13.

Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 15 maart tot 15 juli uit groene braak
- Een kievitstrook bestaat uit een strook van minimaal 6 meter
- De strook wordt tot 15 juli niet bewerkt
- De rand bestaat bij begin rustperiode uit zwarte braak
- De begroeiing als groenbemester wordt voor de rustperiode ondergewerkt
- Dit pakket kan het beste gecombineerd worden met pakket 42: legselbeheer op bouwland (pag. 14). Het wordt dan als strook in of rand langs het perceel gelegd. Het mag niet overlappen
- Het Collectief bepaalt of dit pakket (meer)waarde heeft op de aangevraagde plek

Kieviten hebben de sterkste luchtmacht tegen predatoren

Vergoeding per hectare per jaar

45a kievitstrook

Opmerkingen

- Een kievitstrook kan midden op het land liggen of aan de rand. Dit kan ook in een weiland, alleen zal de gewascode aangepast moeten worden voor dit gedeelte
- Nesten van kieviten op hetzelfde perceel kunnen naar de kievitstrook toe verplaatst worden (dagelijks een paar meter), in overleg met de gebiedscoördinator

Weidevogelbeheer – Mozaïekvergoeding

De weidevogels vragen een flinke inzet van de deelnemer. Het aanpassen van het bouwplan en inspanningen om de plas-dras te controleren vergen extra tijd. Daarom wil het collectief de extra inzet hiervoor, de kosten en de prestatie belonen. De vergoeding is een toeslag voor de totale hectares aan zwaar beheer. De hoogte van de toeslag is gekoppeld aan de verhouding zwaar beheer en legselbescherming.

Instapeisen

- minimaal 18% aan zwaar beheer, minimaal 1 hectare, dit geldt voor de pakketten: 1, 3, 5, 6, 8, 41 & 45
- minimaal 0,3 hectare (greppel)plas-dras
- extra vergoeding met minimaal 1 hectare kruidenrijk grasland

De pakketten legselbeheer (nr. 4) en botanische/kruidenrijke randen (nr. 13c en nr.5 als rand) komen niet in aanmerking voor de mozaïektoeslag

Vergoeding per hectare per jaar

De vergoeding is gestaffeld. Van 18% tot 35% aan zwaar beheer (zie boven) levert een ander bedrag op. Met minimaal 0,3 hectare (greppel)plas-dras kom je voor toeslag 2 in aanmerking. Met minimaal 1 hectare kruidenrijk grasland bovenop de (greppel)plas-dras kom je voor toeslag 3 in aanmerking.

Percentage	Toeslag 2	Toeslag 3
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		

**De mozaïektoeslag kan op maximaal 30% zwaar beheer worden gegeven.*

***De mozaïektoeslag is gelimiteerd, bij overschrijving zal het bedrag evenredig worden aangepast over de deelnemers*

Weidevogelbeheer – Pakket 4a: legselbeheer op grasland en pakket 42: legselbeheer op bouwland

Beheereisen pakket 4a

- Op de percelen wordt gezocht naar nesten
- Gevonden nesten worden geregistreerd (bijv. stalkaart of digitaal (via de database van www.boerenlandvogelsnederland.nl))
- Gevonden nesten worden beschermd als er werkzaamheden of beweiding op afzienbare tijd plaatsvinden
- Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van ten minste 50 m² met minimaal een straal van 3,5 meter aangehouden om de aanwezige gevonden nesten
- Bij beweiding is het nest afgezet, in de vorm van een draadje

Pakket en vergoeding per hectare per jaar

4a legselbeheer op grasland €0,-

Legselvergoeding

De nestvergoeding is gestaffeld. Afhankelijk van het percentage zwaar beheer wordt de vergoeding berekend.

Toeslag k: scholekster, Kievit en eenden (overig)

Toeslag g: grutto, tureluur, veldleeuwerik, slobbeend, zomertaling en overige soorten weidevogels.

Beheereisen pakket 42

- Op de percelen wordt gezocht naar nesten
- Gevonden nesten worden geregistreerd (bijv. stalkaart of digitaal (via de database van www.boerenlandvogelsnederland.nl))
- Indien een perceel bouwland met nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest gespaard door het tijdelijk te verplaatsen of door om het gemarkeerde nest heen te werken
- Pakket b t/m d: Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf het eerste legsel t/m 15 mei, 22 mei of 1 juni
- In de rustperiode worden geen werkzaamheden uitgevoerd zoals zaaien, frezen, schoffelen, eggen en bemesten

Pakket en vergoeding per hectare per jaar

42a Legselbeheer op bouwland

€ 0, - -> legselvergoeding

42b Rustperiode op bouwland van 15 maart tot 15 mei

42c Rustperiode op bouwland van 15 maart tot 22 mei

42d Rustperiode op bouwland van 15 maart tot 1 juni

Percentage	Toeslag K	Toeslag G
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
100		

Weidevogelbeheer – Pakketten 4b t/m f: kuikenvelden

Telt mee in uitbetaling mozaïektoeslag, niet voor de hoogte percentage zwaar beheer.

Een kuikenveld is een last minute pakket in het seizoen. Het komt voor dat er op percelen met legselbeheer of op percelen met zwaar beheer, kuikens en/of nesten zijn terwijl het maaien aanstaande is. In dat geval kunnen kuikenvelden worden afgesloten.

Beheereisen

- Op een afgesproken deel van het perceel met legselbeheer geldt een rustperiode van twee tot zes weken in de periode van 1 mei - 1 augustus
- Als het pakket in de vorm van stroken wordt aangelegd, moeten deze minimaal zes meter breed zijn
- Kuikenvelden mogen pas worden gemaaid of geweid worden na het vrijgeven door de gebiedscoördinator of polderregisseur. Hij/zij controleert of er daadwerkelijk geen kuikens meer zitten. Is dat wel het geval, dan dient de rustperiode te worden verlengd met één of enkele weken tot er geen kuikens meer aanwezig zijn.

Pakket en vergoeding per hectare per jaar

4d legselbeheer plus 2 weken rust

4e legselbeheer plus 3 weken rust

4f legselbeheer plus 4 weken rust

4g legselbeheer plus 5 weken rust

Maaien op maat

Het beheerpakket is voor percelen waar vermoed wordt dat er kuikens en/of nesten zitten. Een polderregisseur of gebiedscoördinator gaat mee met het maaien om opvliegende vogels (nesten) te lokaliseren zodat hier omheen kan worden gemaaid. Voorwaarde hiervoor is langzaam maaien, op aangeven van de bijrijder. Creëren van vluchtmogelijkheid kan door middel van een kuikenveld.

Pakket en vergoeding per hectare per jaar

Collectief pakket maaien op maat

Opmerkingen

- Vergoeding geldt voor legfels die tijdens de werkzaamheden gespaard worden
- Geen werkzaamheden zoals baggerspuiten, mits vrijgegeven door de gebiedscoördinator of polderregisseur
- Geen wandelaars of andere verstoring in het broedseizoen
- Geen honden en of katten in het perceel

Weidevogelbeheer – Pakket 51: predatierasters

In bepaalde delen van de weidevogelgebieden zijn er locaties waar predatoren als de vos een te grote impact hebben. Deze succesvolle opportunist kan grote schade aanrichten. Met een predatieraster kan de vos geweerd worden. Het raster moet geplaatst, gecontroleerd, onderhouden en verwijderd worden. De rasters worden grotendeels in sloten geplaatst.

Beheereisen

- Het raster staat van 15 maart tot 22 juni
- Predatierasters worden gedurende het weidevogelseizoen onderhouden
- Er is een wekelijkse controle van het raster nodig: spanning meten en vegetatievrij maken
- Eventuele spanningslekken worden gerepareerd

Pakket en vergoeding per strekkende meter

51a1 Rasters tegen grondpredatoren: plaatsen, onderhoud en verwijderen

51a2 Rasters tegen grondpredatoren: alleen onderhoud (plaatsen en verwijderen gebeurt in samenwerking met polderregisseur en/of gebiedscoördinator)



Vossenwerend raster (foto: Maarten van Beek)

Weidevogelbeheer – Pakket 30a: zwarte Stern

Dit pakket richt zich op de bescherming en voortplanting van de zwarte stern. De zwarte sterns vragen bijzonder beheer omdat ze graag in de overgangszone van water naar oever in sloten broeden, op vlotjes. Dat in kleine kolonies die niet ver uit elkaar liggen. De locatie wordt bepaald door de begrenzing, in overleg met de gebiedscoördinator.

Beheereisen

- Er worden op een onderlinge afstand van ten minste 5 tot 10 meter en uiterlijk op 1 mei, 5 -10 vlotjes in de sloot uitgelegd
- De deelnemer houdt bij op hoeveel vlotjes gebroed wordt en hoeveel jongen er uit komen
- De vlotjes worden aangekleed volgens instructies
- Aan weerskanten van de sloot met vlotjes, liggen botanische weideranden van minimaal 2 meter breed en elk ten minste 250 m lang. Bij een scheisloot is er één rand van 500 m lang en 2 m breed
- Bemesting van de rand is jaarrond niet toegestaan
- De rand wordt tussen 1 april en 1 juli niet gemaaid, gerold, gesleept of beweid en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is in die periode niet toegestaan
- Zolang er nog zwarte sterns gebruik maken van de vlotjes mag de rand na 1 juli niet worden gemaaid of beweid
- Als het aangrenzende perceel wordt beweid, moet er een veewerend raster worden geplaatst
- Als er op 15 juni geen nesten en/of kuikens meer op de vlotjes zitten, mag (na overleg met de gebiedscoördinator) de rand worden beweid
- Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de rand is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel
- De beheereenheid mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid
- De vlotjes worden, voor zover zij niet langer door de zwarte stern gebruikt worden, uiterlijk op 1 september uit het water gehaald, schoongemaakt, gedroogd en opgeslagen

Melden

Indien een raster wordt geplaatst om vee uit de rand te houden, dient dat binnen zeven dagen na het plaatsen van het raster te worden gemeld bij het collectief, via e-mailadres info@collectieflopikerwaard.com.

Vergoeding per locatie (= 0,1 hectare)

30a Nest- en opgroei gelegenheid Zwarte stern, met rust in de aanliggende rand tot tenminste 1 juli

Indien rand vanaf 15 juni wordt vrijgegeven, daalt de vergoeding naar Vergoeding raster

Botanisch beheer – Pakket 13H

Botanische graslanden zijn belangrijk vanwege hun botanische waarde. Daarnaast zijn ze ook van belang voor de fauna. Botanisch grasland kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leefomgeving van vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Het gaat vaak om typisch 'ouderwets' grasland met een wat pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron voor dieren; de aanwezige nectar trekt insecten aan die op hun beurt voedsel kunnen vormen voor diverse boerenlandvogels. Door percelen die beweid zijn niet te bloten, blijven de 'eilandjes' met langer gras behouden. Ook deze leveren een biodiversiteitswaarde.

Het streven is dat er zo'n 15-20 verschillende grassen en kruiden per 25 m² aanwezig zijn.

Soortenrijke graslanden subsidieert de provincie alleen in het NNN-agrarisch en in de Groene Contour.

Beheereisen

- De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht. In overleg met het collectief kan een onderhoudsbemesting met ruige mest of bekalking worden gegeven
- Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op minimaal 90 % van de oppervlakte
- Het gewas wordt jaarlijks minimaal één keer gemaaid en afgevoerd, niet klepelen
- Minimaal acht verschillende indicatorsoorten zijn in een meetvak aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober
- Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd
- Geen beweiding van 1 oktober tot 1 maart
- Onkruidbestrijding: probleemkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10% van het perceel of de rand) chemisch worden bestreden. Dit geldt voor haarden van akkerdistel, ridderzuring, brandnetel en jacobskruiskruid

Pakket en vergoeding per hectare per jaar

13h Botanisch hooiland volvelds (alleen in begrensde gebieden)



Water - Inleiding

De Lopikerwaard heeft een enorm aantal kilometers aan sloten. Deze zijn vanuit het verleden intensief gesloot en bijgehouden. Dit intensieve sloten heeft een negatieve impact op de biodiversiteit en leidt tot sloten die geen kikkers of vissen meer hebben.

Met specifieke beheermaatregelen willen we de biodiversiteit verhogen. Zodat we ruimte kunnen bieden aan krabbenscheer en andere waterplanten waar de vissen en kikkers in kunnen schuilen. Dit is in samenwerking met het waterschap HDSR.

Onder slootbeheer verstaan we de sloot zelf, oevers en de rand van het aangrenzende perceel. Dit vertaalt zich in de volgende beheerpakketten:

Botanische weiderand ->	pakket 13c (pag. 20)
Natuurvriendelijke oever ->	pakket 10 (pag. 21)
Baggeren met baggerspuut ->	pakket 12a (pag. 22)
Ecologisch slootschonen ->	pakket 12b (pag. 23)
Ecologisch slootschonen ->	pakket 12c (pag. 24)
Slotenplan ->	vanaf 2024 (pag. 26)

Stapeling GLB en ANLb

Met de voorwaarden vanuit de conditionaliteit is het mogelijk om aanvullend ANLb af te sluiten. Het gaat om het stapelen van vergoedingen. Het gaat daarbij om de vergoeding ANLb min de kosten van de verplichting. Dubbel vergoeden met eco-regelingen en ANLb kan niet.

De slootkant krijgt vanuit de conditionaliteit een verplichte bemestingsvrije zone van 5, 3, 1 of 0,5 meter breed (tot max. 4% van de perceeloppervlakte). In ons gebied zal dat in de praktijk dus een strook worden van 1 m of 0,5 m breed (buiten KRW watergangen). Beweiden van deze strook is toegestaan, bemesten en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet.

In het geval van overlap tussen ANLb-pakket 13c (botanische weiderand) en GLMC4 kun je nog steeds een vergoeding voor inkomstenderving krijgen, want een bufferstrook in de GLMC4 hoeft niet per se niet-productief te zijn. Dus als je die strook niet-productief beheert via het ANLb doe je iets extra's en de inkomstenderving die daaruit voortvloeit kun je vergoed krijgen. Maar die inkomstenderving is natuurlijk wel lager vanwege de GLMC-eis van niet bemesten/geen gewasbeschermingsmiddelen.

In de praktijk zal de 2e meter van de rand hierdoor de maximale vergoeding hebben en de 1e meter (slootkant) de aangepaste vergoeding. Dit verrekenen we in één tarief.

De verplichte bufferstrook van GLMC4 mag ook gecombineerd worden met eco-activiteit 'bufferstrook met kruiden', want in de waardeberekening van die eco-activiteit is rekening gehouden met die overlap. In dat geval is de bufferstrook minimaal 3 meter breed. Beweiden is in deze strook niet toegestaan.

Water – Pakket 13c: botanische grasland randen

Botanische randen zijn belangrijk voor de biodiversiteit rondom de sloten. In de overgang van land naar water leven de meeste dieren. Daarbij is de vegetatie op de oevers divers aan kruiden en insecten. Het beheer is daarbij toegespitst op afwisseling en het gebruik door specifieke slootsoorten. Zie bijvoorbeeld [libellesloten](#).

Beheereisen

- De rand is twee meter breed
- Randen liggen aan de buitenkant van het perceel, aan de sloot
- De rand wordt niet bemest
- Minimaal vier verschillende indicatorsoorten zijn in een meetvak aanwezig
- In de rand wordt geen bagger of slootvuil opgebracht
- Het gewas wordt jaarlijks afgeweid of minimaal één keer gemaaid en afgevoerd. Klepelen is niet toegestaan
- 13c2 en 13c3: Bij het maaien van de 1e snede:
 - blijft de 1e meter vanuit de insteek altijd staan!
 - mag de 2e meter worden (mee)gemaaid, bij voorkeur wanneer er witbol of glanshaver in voorkomt
- Bij het maaien van de 2e snede mag de hele rand worden meegemaaid. Maaien met een stoppel van 15 centimeter
- Beweiden van de rand is toegestaan, wel wordt uitrasteren gewaardeerd of kan gebruik van een mobiele drinkbak het uittrappen van de kant beperken
- Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid
- Het grasland wordt niet gescheurd en/of gefreesd
- 'Libellerand' (13c4): gehele rand met 1e snede meemaaien, 1e meter vanuit de insteek wel met stoppel van 15 cm. Na 1e snede de 1e meter van de rand niet maaien tussen 15 juni en 15 september. Deze rand ligt bij voorkeur langs een krabbenscheersloot

Botanische rand 2 m ANLb bovenop GLMC-verplichte bufferstrook

13c2 Botanisch waardevolle weiderand: hele rand 1^e snede laten staan

13c3 Botanisch waardevolle weiderand: 1e meter langs sloot niet maaien
bij 1e snede, 2e meter mag wel bij eerste snede worden meegemaaid

13c4 Botanisch waardevolle weiderand t.b.v libelles: rand 1e snede
meemaaien, dan rust tot 15 september

Opmerkingen

- Van randen die al schraal zijn, de 2e meter graag laten staan bij de 1e maaisnede!
- Pakket 13c4 wordt overeengekomen met de gebiedscoördinator. Vooral van belang bij krabbenscheersloten.

Water – Pakket 10ad: natuurvriendelijke oever

Een natuurvriendelijke oever is een oever met een flauw talud waar ruimte is voor oevervegetatie. Het heeft een belangrijke functie voor soorten als bittervoorn, grote modderkruiper en rugstreeppad. Ook purperreigers en weidevogels hebben hier voordeel van. Een natuurvriendelijke oever heeft een talud van 1:5. Dit pakket kan niet in combinatie met pakket 12b/12c.

Beheereisen

- De natuurvriendelijke oever moet éénmaal per twee à drie jaar worden geschoond, in mozaïekvorm, d.w.z. ieder jaar een ander deel: dus jaarlijks 33-50%
- Het maaien en schonen van de watervegetatie gebeurt in de periode van 15 september tot 1 november
- Maaisel moet worden afgevoerd binnen ongeveer een week na het maaien of minimaal 1 meter buiten de beheereenheid worden gedeponneerd
- Bij een aanliggende botanische weiderand (pakket 13c) brengt u het maaisel buiten de weiderand op het perceel of u voert het maaisel direct af
- De beheereenheid mag niet worden beweide
- Bij beweiding op het aanliggende perceel, wordt de natuurvriendelijke oever uitgerasterd. Dit om vertrapping van de slootkant tegen te gaan
- De beheereenheid mag niet worden bemest
- Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en brandnetel en op maximaal 10% van de beheereenheid
- Om verlanding tegen te gaan, moet een oeverzone één keer per acht jaar worden uitgekrabd tot een diepte van 10-25 cm. Onder de waterlijn afgestorven plantenresten, bladeren en bagger worden dan weggehaald
- Nieuw aangelegde natuurvriendelijke oevers hoeven de eerste jaren vaak minder gemaaid te worden, zodat de vegetatie zich goed kan ontwikkelen. Voorkom wel de opslag van bomen zoals wilgen en elzen. Trek regelmatig (één keer per jaar) jonge boompjes uit de oever

Melden

- Wanneer het beheer in de vorm van schonen en of maaien heeft plaatsgevonden en het maaiafval is verwijderd, moet dit binnen zeven dagen bij het collectief worden gemeld, via mijnboerennatuur.nl.

Vergoedingen per hectare per jaar

10ad Natuurvriendelijke oever met een flauw talud

Water – Pakket 12a: baggeren met baggerspuit

Doel is om op een zo natuurvriendelijk mogelijke manier de sloot op diepte te houden; de baggerpomp maakt dit mogelijk. Baggerspuiten vindt alleen plaats als de baggerdikte te groot is geworden. Het slootleven heeft een baggerdikte van zo'n 15 cm nodig. Meer baggeren is slecht voor het slootleven. Bovendien kan de slootbodem worden aangetast, met als gevolg oevererosie en afkalving.

Bij het collectief Lopikerwaard gaat pakket 12a onderdeel uitmaken van een meerjarig slotenplan (vanaf 2024). Baggerspuiten wordt dan alleen vergoed als het past in het slotenplan. Dit pakket is alleen mogelijk in combinatie met ecologisch slootschonen.

Beheereisen

- Het baggerspuiten vindt plaats tussen 1 juli en 1 november
- Baggerspuiten in sloten met krabbenscheer tot 1 oktober
- De sloot is minimaal twee meter breed en loopt niet droog door het baggerspuiten
- De bagger wordt vanuit het midden van de sloot zo rustig mogelijk weggehaald, iedere keer uit dezelfde werkgang. Bij brede sloten (> 7 m) zijn twee werkgangen toegestaan
- In doodlopende sloten altijd naar het open einde toe werken
- Gebruik een baggerpomp zonder vleugels
- De sloten worden gefaseerd gebaggerd, dus niet alle sloten in een keer. 1x in de vier à vijf jaar wordt aanbevolen. Maximaal 50% per jaar
- Na het baggerspuiten blijft minstens 15-20 cm bagger achter in de sloot
- De bagger komt niet in de slootkant en wordt niet in een botanische weiderand gespoten

Melden

Wanneer beheer in de vorm van baggerspuiten heeft plaatsgevonden, moet dit binnen zeven dagen bij het collectief worden gemeld, via mijnboerennatuur.nl.

Vergoeding per gebaggerde strekkende meter

12a Baggeren met baggerpomp

Zie slootplannen (pag. 26)

Water – Pakket 12b: ecologisch slootschonen

Doel van dit pakket is om stevige en soortenrijke oevers te krijgen, evenals een divers onderwaterleven. De slootkant wordt niet beschadigd en het wortelpakket van de vegetatie blijft heel.

Een stevig wortelende oevervegetatie beschermt de oever tegen erosie en afkalving.

In de Keur is vastgelegd dat een strook van 20% van de breedte van de sloot mag blijven staan als begroeiing. Dus van kant tot kant schonen is niet nodig.

Bovendien: als je de sloten te grondig schoont, blijft er te weinig plantmateriaal over als voedsel voor de Amerikaanse rivierkreeft. Die vreet vervolgens de sloot kaal. Een begroeide kant biedt voedsel voor de kreeft en bescherming van de kant om schade door de rivierkreeft te minimaliseren.

Beheerreisen

- Het ecologisch slootshonen vindt plaats tussen 15 augustus en 1 november
- De sloten worden gefaseerd geschoond, dus niet allemaal in één keer of slechts één zijde van de sloot. Maximaal 50% per jaar
- De planten op de slootbodem, het talud en de slootkant worden boven de wortels afgemaaid en niet eruit getrokken
- Maaisel wordt verwijderd, of minimaal 1 m uit de slootkant op het perceel gedeponneerd en afgevoerd. Let op: als u een botanische weiderand heeft, dan dient de bagger en het vuil achter de strook gelegd te worden of afgevoerd te worden
- Er wordt geschoond met de maaikorf of ecoreiniger. Schonen met Hemos wordt niet vergoed.

Melden

Wanneer beheer in de vorm van slootschonen heeft plaatsgevonden en het maaisel is afgevoerd of verder op het land gelegd, moet dit binnen zeven dagen bij het collectief worden gemeld, via mijnboerennatuur.nl.

Opmerkingen

- Maai bij de laatste snede de slootkant diep uit, dan kan het slootschonen soms ook overgeslagen worden
- Voorkom zoveel mogelijk uittrappen van de slootkant, raster de slootkant uit (i.c.m. pakket 13c) of gebruik een mobiele drinkbak
- Kijk of u in aanmerking komt voor de aanschaf van een waterdrinkbank via de regeling bodem en water bij de Watermakelaar (<https://www.hdsr.nl/werk/info-op-maat/agrariers/subsidieregeling-regionaal-partnerschap/>)

Vergoeding per geschoonde strekkende meter

12b	ecologisch slootschonen	standaard;
12b	ecologisch slootschonen incl. botanische randen	standaard;

12b Scheislotten

Zie slotenplan voor toelichting.

Water – Pakket 12c: ecologisch slootschonen (krabbenscheersloten)

Dit pakket richt zich in het bijzonder op het schonen van sloten met krabbenscheer. Krabbenscheer vergt een eigen aanpak. Voor het behoud van de plant zelf, maar ook voor de libellensoort groene glazenmaker. De groene glazenmaker is afhankelijk van krabbenscheer.

Het pakket wordt onderdeel van het slotenplan vanaf 2024.

Beheereisen

- Het ecologisch slootschonen vindt plaats tussen 15 augustus en 1 november
- Er wordt geschoond met een maaikorf of een ecoreiniger. Schonen met de Hemos wordt niet vergoed
- De sloten worden gefaseerd geschoond, dus niet allemaal in één keer of slechts één zijde van de sloot. Dit op basis van de hoeveelheid planten, zie afbeelding op de volgende pagina.
- Schoon alleen bij een vol gegroeide sloot of bij blokken krabbenscheer die over een flinke lengte van kant tot kant de sloten vullen. Haal vervolgens nooit meer dan 30% van de begroeiing met krabbenscheer weg
- Maaisel wordt verwijderd, of minimaal 1 m uit de slootkant op het perceel gedeponeerd en afgevoerd. Let op: heeft u een botanische weiderand, dan bagger en vuil achter de strook neerleggen of afvoeren

Melden

Wanneer beheer in de vorm van slootschonen heeft plaatsgevonden en het maaisel is afgevoerd of verder op het land gelegd, moet dit binnen zeven dagen bij het collectief worden gemeld, via mijnboerennatuur.nl.

Opmerkingen

- Voorafgaand aan slootschonen de kant diep uitmaaïen
- Maai bij de laatste snede de slootkant diep uit, dan kan het slootschonen soms ook overgeslagen worden
- Voorkom zoveel mogelijk uittrappen van de slootkant, raster de slootkant uit (i.c.m. pakket 13c) of gebruik een mobiele drinkbak
- Kijk of u in aanmerking komt voor de aanschaf van een waterdrinkbank via de regeling bodem en water bij de Watermakelaar (<https://www.hdsr.nl/werk/info-op-maat/agrariers/subsidieregeling-regionaal-partnerschap/>)

Vergoeding per geschoonde strekkende meter

Zie pakket 12b, ecologisch slootschonen.

Gefaseerd schonen van krabbenscheer sloten kan op diverse manieren:

Vooraf: alleen slootschonen als de sloot volgroeid is met krabbenscheer.



De helft van de sloot. In jaar 1 wordt de ene kant de sloot geschoond. Het krabbenscheer aan de andere zijde van de sloot kan dan weer uitgroeien. Al naar gelang het uitgroeien van de krabbenscheer, kan vervolgens in het 3e of 4e jaar erna (2e jaar is vaak te vroeg) de andere kant van de sloot worden geschoond.



Vakken van circa 5 bij 4 meter uitnemen (Bij een dichte vegetatie, bedekking 75-100%). De werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd met een maaikorf. Verspreid in de dichte vegetatiedelen worden vakken van circa 5 bij 4 meter uitgenomen. **Maximaal 20 tot 30% van de aanwezige vegetatie wegnemen!**



Blokken van minimaal 25 en maximaal 50 meter om en om schonen (Bij een dichte vegetatie **over een grote lengte in een lengte sloot**, bedekking 75-100%). Hierdoor ontstaat ruimte voor de krabbenscheer om weer uit te breiden/ te verjongen naar open water. **Maximaal 20 tot 30% van de aanwezige vegetatie wegnemen!**



Middenste deel van de sloot laten staan. Sloten met krabbenscheer **die zwaar begroeide oevers hebben**, met bijvoorbeeld gele lis en egelskop, kunnen het beste aan beide kanten van de sloot worden geschoond, waarbij er een middenbaan blijft staan met krabbenscheer. Vanuit het midden kan de krabbenscheer zich dan weer uitbreiden naar de kanten van de sloot, terwijl dominantie van oevervegetaties worden voorkomen.

Water – Slotenplan

Ecologisch slootschonen en baggerspuiten dienen met beleid te worden uitgevoerd. Vanuit de historie schouw worden de sloten te schoon gemaakt. In overleg met het waterschap willen we maatwerk per bedrijf. Dit wordt samengevat in een slotenplan. U kunt zelf een slotenplan maken en ons voorleggen ter goedkeuring. Vóór 2024 moet het plan ingediend zijn. De vergoeding en werkzaamheden in 2023 worden bij de uitbetaling over 2024 verrekend.

We gaan ervan uit, afhankelijk van de hoeveelheid baggeraanwas, dat een sloot eens in de 4 à 5 jaar gebaggerd moet worden. Schonen van de sloot kan meestal om en om of eens in de 2 jaar. De waterschappen zeggen toe soepeler te zijn met hun schouwbeleid. Het slotenplan omvat een samenhang van de pakketten 12a, b en c en pakket 13c. In een goedgekeurd slotenplan is ruimte om de kant één keer per 6 jaar op te halen.

Melden

Wanneer beheer in de vorm van baggerspuiten of slootschonen heeft plaatsgevonden en het maaisel is afgevoerd of verder op het land gelegd, moet dit per beheereenheid, binnen zeven dagen bij het collectief worden gemeld, via mijnboerennatuur.nl.

Opmerkingen

- voorkom zoveel mogelijk uittrappen van de slootkant, raster de slootkant uit (i.c.m. pakket 13c) of gebruik een mobiele drinkbak
- Kijk of u in aanmerking komt voor de aanschaf van een waterdrinkbak via de regeling bodem en water bij de Watermakelaar (<https://www.hdsr.nl/werk/info-op-maat/agrariers/subsidieregeling-regionaal-partnerschap/>)

Vergoeding

Hoe meer verschillende pakketten in samenhang worden afgesloten, hoe hoger de jaarlijkse vergoeding. In onderstaande tabel staan de bedragen per meter sloot per jaar, ongeacht hoeveel onderhoud er daadwerkelijk is uitgevoerd, mits het slotenplan is gevolgd. De betaalde meters betreffen sloten die meedoen in het slotenplan.

Jaarlijkse vergoeding bij uitvoering slotenplan:

	Bij uitvoering slotenplan	Combinatie slotenplan met 13C: botanische weiderand
12a. Baggerspuiten	Alle lengtemeters sloot met pakket 12a x per jaar	Alle lengtemeters sloot met pakket 12a x
12b. Ecologisch slootschonen met maaikorf of ecoreiniger (niet met Hemos)	Alle lengtemeters sloot met pakket 12b x per jaar	Alle lengtemeters sloot met pakket 12b x
12c. Krabbenscheer	Alle lengtemeters sloot met pakket 12c x	Alle lengtemeters sloot met pakket 12c x

- Toevoeging 2024 scheisloten, dit is de helft van bovenstaande vergoeding

Dooradering – Pakket 9: poel

Poelen zijn natuurlijke laagtes of kuilen die vaak gegraven zijn voor de drinkwatervoorziening van het vee. Een poel is een belangrijke biotoop voor amfibieën als kamsalamander en rugstreeppad. Openheid rondom (een deel van) de poel kan de zichtbaarheid en beleefbaarheid vergroten en is van belang om een goed voortplantingsbiotoop voor amfibieën te behouden.

Beheereisen

- Minimaal de helft van de natte oppervlakte van de poel bestaat in de periode 15 maart tot 15 juni uit water zonder riet, lis of andere opgaande waterplanten. Voor behoud van voldoende open water wordt de poel periodiek opgeschoond
- Jaarlijks wordt in de periode van 1 september tot 15 oktober 25% tot 50% van het natte oppervlakte van de poel (waterplanten) geschoond
 - Indien meer dan 50% van de poel bestaat uit water zonder enige vegetatie aan het oppervlakte, dan kan het schonen dat jaar achterwege gelaten worden
 - Bij groot onderhoud wordt maximaal 75% van de poel geschoond, dit gebeurt in overleg met de gebiedscoördinator
- Jaarlijks wordt in de periode van 1 september tot 15 oktober 2/3 van de droge oever gemaaid
- Snoeiafval en maaisel blijft minimaal 2 tot maximaal 5 dagen op de oever liggen om fauna de kans te geven terug te keren naar de poel. Opgaand hout dient verwijderd te worden uit de poel

Aanvullende beheervoorschriften

- Een incidentele droogval is toegestaan in de periode 15 juni tot 15 november
- Bagger mag niet verwerkt worden in en rond (<2m) de poel
- Bij voorkeur is de poel op het diepste punt 50 cm dieper dan zomerpeil
- Bij het gebruik als vee-drinkplaats is de poel minimaal over 75% van de oeverlengte uitgerasterd op zo'n wijze dat vee enkel met de voorpoten bij het water kan komen om te drinken. Hiermee wordt overmatige vertrapping van de oever en bemesting door ontlasting in het water voorkomen
- Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen/chemische onkruidbestrijding en meststoffen in de poel en een straal van 2m hieromheen gebruikt worden
- Er mogen geen vissen of andere dieren worden uitgezet of gekweekt
- De poel mag niet in open verbinding staan met sloten of weteringen
- Aanwezigheid van bomen en struiken op de oever is alleen toegestaan op de noordelijke oever, voor maximaal een derde van de totale oeverlengte. Eventuele begroeiing op minimaal 2 meter van de poel
- Het noordelijke talud van de poel heeft voor minimaal 1/3 deel een talud van 1:5 of flauwer
- Machines dienen buiten het water en de natte oeverzone te blijven en dienen bij gebruik schoon te zijn om insleep van invasieve exoten (m.n. watercrassula) en ziekten te voorkomen

Melden

Melding binnen 7 werkdagen via mijnboerennatuur.nl

Vergoeding per stuk per jaar

9a kleine poel (kleiner dan 175 m²) 25% - 50% schonen

9b grote poel (groter dan 175 m²) 25% - 50% schonen

Dooradering – Pakket 20: hakhoutsingel

Een elzensingel is een vrij liggend, lijnvormig en aaneengesloten landschapselement van één rij. De singel bestaat grotendeels uit zwarte els en wordt als hakhout beheerd. Het element is minimaal 25 meter lang. Windsingels om productieboomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype.

Beheereisen

- Voorwaarden voor beheer: als een singel minder dan 75% bedekking heeft, wordt deze aangevuld met streekeigen plantmateriaal (veelal kan dat met zaailingen uit het element)
- Jaarlijks is minimaal 5% tot maximaal 40% van oppervlakte gekapt
- Beheer vindt jaarlijks plaats vanaf 15 oktober tot en met 14 maart. De landschappelijke verschijningsvorm blijft hierbij in stand
- Snoeiafval is verwijderd
- Als takken of stammen versnipperd worden, mogen de snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid
- Er wordt beschermd tegen schade als gevolg van beweiding op aangrenzende gronden. Het raster mag niet aan de bomen bevestigd worden (als er geen vee in het aangrenzende perceel loopt, is een raster niet nodig)
- Bemesting is niet toegestaan
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. het behandelen van de stobben van de Amerikaanse vogelkers
- Ieder jaar wordt het element gecontroleerd op dood hout dat een risico oplevert voor de veiligheid. Exoten worden verwijderd en bramen worden teruggesnoeid
- Branden is in de beheereenheid of in de directe omgeving daarvan niet toegestaan
- Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in het element

Melden

Melding binnen 7 werkdagen via mijnboerennatuur.nl

Vergoeding per boom

20c26.01 Houtkade of -singel, jaarlijks beheer en afzetten eens in de 6 jaar

20c25.03 Elzensingel, > 75 % bedekking, jaarlijks beheer en afzetten eens in de 6 jaar

Dooradering – Pakket 21: beheer van (knot)bomenrijen

Bomenrijen hebben niet alleen een landschappelijke waarde, maar zijn ook functioneel als broed-gelegenheid voor vogels (zoals de steenuil), of als ecologische corridor.

Beheereisen

- De bomenrij ligt langs een agrarisch perceel en niet op een erf, en bestaat uit minimaal 10 bomen
- Jaarlijks is minimaal 5% tot maximaal 40% van oppervlakte van beheereenheden in het leefgebied gekapt, geknot of gedund ten behoeve van het handhaven van de verschijningsvorm
- Snoeien mag plaatsvinden in de periode van 1 oktober tot 15 maart
- Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd
- Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee. Als een raster wordt toegepast, dan mag dit niet aan de bomen worden bevestigd. Oudere bomen hebben geen raster nodig bij begrazing door koeien of schapen. Bij begrazing door paarden of geiten is wel een raster nodig
- Chemische onkruidbestrijding toegestaan op maximaal 10% van de oppervlakte

Aanvullende beheervoorschriften

- Bomenrijen worden als aaneengesloten rij in stand gehouden. Als er gaten in de rij zijn van meer dan 10 meter zonder bomen, dan dient men deze gaten op te vullen met streekeigen plantmateriaal/bomen
- Knotwilgen worden minimaal 1 keer per 6 jaar gesnoeid en maximaal 1 keer per 3 jaar. Een rij knotwilgen wordt niet allemaal tegelijk in 1 jaar geknot, maar bijvoorbeeld één op de drie of één op de vier bomen en de rest niet. Dit is belangrijk voor de overleving van een aantal soorten wilde bijen die afhankelijk zijn van het stuifmeel van de bloeiende wilgen en die in de buurt van de wilg in de grond overwinteren. Deze wilde bijen hebben in het voorjaar op 150-500 meter van hun overwinteringsplek hun voedsel nodig, anders gaan ze dood
- Gedurende de contractperiode worden alle bomen minimaal eenmaal gesnoeid; bij oudere bomen kan het snoeien zich beperken tot het verwijderen van dood hout (indien noodzakelijk)
- Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid
- Bemesting is niet toegestaan
- Niet branden in, of in de directe omgeving van het element

Melden

Laag tarief jaarlijks, na melding binnen 7 werkdagen via mijnboerennatuur.nl hoog tarief

Vergoeding per boom L21a.

Bomenrijen (laag tarief/hoog tarief)			Knotbomenrijen (laag tarief/hoog tarief)		
26.01	Bomenrij diameter < 20cm		26.04	Knotbomenrij < 20cm 1x knotten	
26.02	Bomenrij diameter 20 – 60cm		26.05	Knotbomenrij 20-60 cm 1x knotten	
26.03	Bomenrij diameter > 60cm		26.06	Knotbomenrij > 60 cm 1x knotten	
			26.07	Knotbomenrij < 20cm 2x knotten	
			26.08	Knotbomenrij 20-60 cm 2x knotten	
			26.09	Knotbomenrij > 60 cm 2x knotten	

Dooradering – Pakket 26: hoogstamboomgaard

Boomgaarden zijn niet alleen landschappelijk waardevol, maar hebben vaak ook ecologische waarde door het voorkomen van in holten broedende vogels zoals de steenuil. Onder de schors van oude bomen leven insecten die jaarrond voedsel bieden aan vogels zoals boomkruiper en grote bonte specht. In het voorjaar trekt de bloesem insecten aan zoals hommels, bijen en zweefvliegen.

Een belangrijk onderdeel van de boomgaard is de onderbegroeiing. Een kruidenrijke vegetatie zorgt voor insecten waar diverse vogels op afkomen. Bij beweiding ontstaat een wat pollige structuur in het grasland waar muizen zich thuis voelen: een smakelijk onderdeel op het steenuilen menu.

Beheereisen

- Jaarlijks min. 25% tot max. 100% van het oppervlakte snoeien van 16 juli tot 15 maart
- Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en het maaiafval is verwijderd
- Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid

Aanvullende beheervoorschriften

- Een hoogstamboomgaard is een verzameling van fruitbomen, met een stam van minimaal 1,5 meter hoog en waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie (geen gazon)
- De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweide, of de boomgaard wordt jaarlijks gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd
- De boomgaard bestaat voor maximaal 10% uit notenbomen
- Een hoogstamboomgaard heeft een minimale oppervlakte van 0,15 ha (bestaat uit minimaal 10 bomen) en heeft een dichtheid van minimaal 75 tot maximaal 150 fruitbomen per ha
- Indien het appel, peer of pruim betreft wordt de boom tenminste eenmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten: enkel vorm- of onderhoudsnoei indien nodig
- Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element
- De stam van de hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Het raster mag niet aan de bomen bevestigd worden. Jonge bomen in een weiland met vee zijn voorzien van een boomkorf
- Bemesting met ruige mest of kalk is toegestaan. Bemesting met andere mestsoorten of kunstmest is niet toegestaan
- Bij bemesten worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd
- Sloopmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid
- Niet branden in, of in de directe omgeving van het element
- Aanwezigheid van elementvreemde zaken (machines, bouwwerken, puin, etc.) is niet toegestaan

Melden

Laag tarief jaarlijks, na melding binnen 7 werkdagen via mijnboerennatuur.nl hoog tarief

Vergoeding per boom (laag tarief/ hoog tarief)

26a Hoogstamboom gemiddelde diameter < 10 cm

26b Hoogstamboom gemiddelde diameter 10 – 30 cm

26c Hoogstamboom gemiddelde diameter > 30 cm

Dooradering – Pakket 27: hakhoutbosje

Boeren hebben al eeuwenlang behoefte aan hout voor allerlei doeleinden. Het kan hierbij gaan om brandhout, staken voor de groentetuin of hout voor gereedschapsstelen. Dit soort bosjes wordt in de volksmond ook wel geriefhoutbosjes genoemd en ze worden van oudsher als hakhout beheerd.

Hakhoutbosjes hebben een hoge biodiversiteitswaarde door de combinatie van hoog opgaande bomen en lagere struiken en de kruidachtige vegetatie daaronder. Vogels broeden, schuilen en foerageren er, zoogdieren vinden er een schuilplaats. De afgestorven bomen kunnen bijzondere mossen en paddenstoelen huisvesten, en ze doen gelijk dienst als insectenhotel. Veel amfibieën vinden er een overwinteringsplaats en vlinders vinden er voedsel en waardplanten om eieren af te zetten.

Beheereisen

- Jaarlijks wordt minimaal 5% tot maximaal 35% van het oppervlakte gesnoeid in de periode van 1 oktober tot 15 maart. Het overige deel wordt in stand gehouden. Indien er besloten wordt om 35% af te zetten, wordt dit minimaal 14 dagen voor de start van de werkzaamheden gemeld bij de gebiedscoördinator; met hem worden dan afspraken gemaakt over de wijze van afzetten
- Snoeiafval op rillen leggen in het leefgebied (niet versnipperen) of snoei- en of maaiafval is verwijderd
- Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte
- De oppervlakte wordt niet beweide
- De hoge bomen (overstaanders) in een hakhoutbosje in weidevogelkerngebied wordt minimaal 1 x 6 jaar afgezet

Aanvullende beheervoorschriften

- Het element is maximaal 1 ha groot, het grenst aan landbouwgrond en is aan minimaal 3 zijden vrij liggend
- Minimaal 80% van de oppervlakte wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet in een cyclus van eenmaal in de 6 jaar
- Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt
- Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element
- Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. Het raster mag niet aan de bomen bevestigd worden
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen)
- Bemesting is niet toegestaan
- Sloopmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid
- Niet branden in, of in de directe omgeving van het element

Melden

Laag tarief jaarlijks, na melding binnen 7 werkdagen via mijnboerennatuur.nl hoog tarief

Vergoeding per hectare per jaar L27b. (laag tarief/ hoog tarief)

26.01 hakhoutbosje nat + eindkap regulier

26.02 hakhoutbosje nat + eindkap weidevogelkerngebied

Verenigingspakket Z11: oeverwaluw

De oeverwaluw is minder bekend dan de boeren- en huiswaluw, die beiden veel op boerenerven broeden. De oeverwaluw komt in april terug uit het overwinteringsgebied in Afrika en zoekt dan een steile wand om in te broeden. Ze graven daarin een gang van ongeveer 75 cm diep. Achterin die gang maken de waluwen een nest. Vroeger zaten oeverwaluwen vaak in uitgesleten oevers van meanderende beken en rivieren. De oeverwaluw is een echte pionier. Als er ergens een geschikte steile zandwand is, hebben ze het vaak snel gevonden.

Doel van het pakket oeverwaluw is om tijdelijke depots van grond of zand, die vooral op boerenerven nog wel eens voorkomen, geschikt te maken als broedlocatie voor oeverwaluwen. De deelnemer moet er zeker van zijn dat de grond in de periode maart tot september ongestoord kan blijven liggen. Als er nesten in komen, dan zijn deze beschermd.

Beheereisen

- De hoop grond ligt in een omgeving die geschikt is als foerageergebied, er is dus water en eventueel kruidrijk grasland in de buurt
- De grond is geschikt om een steile wand te maken, lemig zand heeft de voorkeur. Los zand is niet geschikt, dit zakt in. Pure klei is ook niet geschikt, dit is te hard
- De wand ligt bij voorkeur op het noorden, noordoosten of oosten
- De grond waarvan de steile wand wordt gemaakt, ligt al minimaal een half jaar op de hoop zodat deze zich goed heeft kunnen zetten en minder snel zal inzakken
- De steile wand wordt in maart aangelegd, doorgaans met een mobiele kraan waarna de wand eventueel met de hand met een spade kan worden bijgewerkt
- De steile wand is minimaal 3 meter hoog als deze op het land ligt
- De steile wand is minimaal 2 meter hoog als deze aan water grenst
- De steile wand is minimaal 10 meter breed
- Indien nodig wordt de steile wand vrij gemaakt van begroeiing of overhangende planten zodat roofdieren de nestholtes moeilijk kunnen bereiken
- De steile wand wordt in stand gehouden tot 1 september, of langer indien er nog vogels van de nestgaten gebruik maken
- Wanneer de wand het volgende jaar nogmaals gebruikt wordt, wordt de wand in maart opnieuw steil afgegraven

Vergoeding per jaar

Z11 Oeverwaluw